

Verslag excursie Koerdam op 13 juli 2019 FWT - FLORON Twente (Andries van Renssen)

10 deelnemers: Wytze Boersma, Theo de Kogel (namens de provincie Overijssel betrokken geweest bij de ontwikkeling van het Deldenerbroek), Ruud Kuiper, Harvey Pierson, Andries van Renssen (coördinatie), Marti Rijken, Harry Scheper, Jo Schunselaar, Ben van Veenen, Otto Zijlstra.

Aanvankelijk was ons oog gevallen op kilometerhok 238-475 (Zomerweg) nabij Deldenerbroek, maar na enig overleg begaven we ons naar 238-477 (Koerdam), 2 kilometer naar het noorden, omdat dat, dankzij de Regge, veelbelovender was. We gingen naar huis met 231 soorten.

Daaronder acht zeggesoorten met als meest opvallende Dwergzegge (*Carex oederi* subsp. *oederi*), Geelgroene zegge (*C. oederi* subsp. *oedocarpa*), Blauwe zegge (*C. panicea*), Scherpe zegge (*C. acuta*), Oeverzegge (*C. riparia*) en Blaaszegge (*C. vesicaria*).

In een zijarm van de Regge zagen we een andere *Cyperaceae*: Mattenbies (*Schoenoplectus lacustris*), want zonder puntjes op het buitenste bloemblad. Eerder hadden we de naamgever van de familie Bruin cypergras (*Cyperus fuscus*) langs de Regge gevonden. Andere *Cyperaceae*: Borstelbies (*Isolepis setacea*), als altijd tamelijk schaars, en Bosbies (*Scirpus sylvaticus*), Gewone waterbies (*Eleocharis palustris*) en Naaldwaterbies (*E. acicularis*).

Van de natte soorten verdienen verder vermelding: Rode waterereprijs (*Veronica catenata*), Kleine lisdodde (*Typha angustifolia*), Slanke waterweegbree (*Alisma lanceolatum*), Pijlkruid (*Sagittaria sagittifolia*), Egelboterbloem (*Ranunculus flammula*), Moeraszuring (*Rumex palustris*), Watertorkruid (*Oenanthe aquatica*), Holpijp (*Equisetum fluviatile*), Lidrus (*E. palustre*), Gewone waternavel (*Hydrocotyle vulgaris*), Echte koekoeksbloem (*Silene flos-cuculi*), beide laatste nogal schaars aanwezig. Gelukkig ontbrak Grote waternavel (*Hydrocotyle ranunculoides*)!

De toppers van de dag waren Waterpunge (*Samolus valerandi*), ook langs de Regge, en Valse kamille (*Anthemis arvensis*), op een grazig veldje evenwijdig daaraan, en elders Bosdroogbloem (*Gnaphalium sylvaticum*).

Verder vermeldenswaard: Zwarte toorts (*Verbascum nigrum*), Liggend en Gevleugeld hertshooi (*Hypericum humifusum* en *H. tetrapterum*) en Basterdamarant (*Amaranthus hybridus* subsp. *hybridus*), die in een strook ingezaaid bloemenmengsel stond.