


Verslag excursie De Haandrik (243-515) op 10 juni 2023

René de Wilde

Deelnemers: Wytze Boersma, Erika van Drimmelen, Harvey Pearson, Pieter Stolwijk, René de Wilde (coördinatie) en Otto Zijlstra



Nadat voor aanvang van de excursie uit een terreinverkenning was gebleken dat bezoek aan de door intensief gebruik benutte Holthemeresch op floristisch vlak zeker als teleurstellend zou worden ervaren, besloot ik het te onderzoeken gebied te beperken tot de nabij de Vecht en het kanaal gelegen bermen en dijken. Vanaf het rendez-vous nabij de kanaalsluis werd eerst de in open verbinding met de Vecht staande zuidelijke oever van het kanaal bekeken. Hier troffen we Lange ereprijs (*Veronica longifolia*) aan, een enkel exemplaar, met dichtbij daarvan

Veldlathyrus (*Lathyrus pratensis*). Iets verderop maakte de berm en kanaalkade plaats voor een min of meer natuurlijker oever van de Vecht met hier een weelderige vegetatie met o.a. Kalmoes (*Acorus calamus*), Hoog struisgras (*Agrostis gigantea*), Watermunt (*Mentha aquatica*) en Gele lis (*Iris pseudacorus*). De insectenfauna was hier iets algemener vergeleken

met de berm met een paar soorten Libellen (*Odonata*) (foto 1). Terug bij de parkeerplek staken we nu het kanaal over waar in de zandige bermen Gewone rolklaver (*Lotus corniculatus var. corniculatus*) werd gevonden



Foto 1: Op een blad Kalmoes rust een Bruine korenbout (*Libellula fulva*) aan de oever van de Vecht (foto R. De Wilde).

Aangekomen op de noordoever van de Vecht ontwaarden we in het rivierwater een Fonteinkruid (foto 2). Gelukkig had Wytze een dreglijntje mee en kon een exemplaar ervan



op het droge krijgen, met brede doorschijnende bladeren met gegolfde bladrand en een stekelpuntje: Glanzig fonteinkruid (*Potamogeton lucens*).

Foto 2: Glanzig fonteinkruid groeit in de Vecht, ter hoogte van de spoorbrug (foto: R. de Wilde).

Ter hoogte van de sluis in de Vecht konden we nog een stuk kademuurbegroeiing bekijken met in de voegen enkele planten Muurvaren (*Asplenium ruta-muraria*) en Tongvaren (*Asplenium scolopendrium*). Helaas gaf de sluiswachter geen toestemming om de

gehele muurpartij te bekijken.

Nabij de sluis namen we even pauze in de schaduw en even daarna konden we kennis maken



met enkele typische soorten van het Vechtdal, groeiend vlak achter de sluis, te weten Kweekdravik (*Bromopsis inermis subsp. inermis*) en Poelruit (*Thalictrum flavum*) (foto 3).

Met in onze fantasie de beelden van vegetaties met Kamgras, Geel walstro, Kattendoorn, Grasklokje en Grote tijm togen we hierna naar de dijk aan de rechterzijde van de rivier, voorbij de sluis. Het door weidevee begraasde dijklichaam bleek inmiddels te

voedselrijk voor deze droombeelden; wel werden een aantal Knolboterbloemen (*Ranunculus bulbosus*) gevonden en een plek van ongeveer een vierkante meter met veel vegetatieve wortelbladen Grasklokje (*Campanula rotundifolia*).

Foto 3: Kweekdravik troffen we fraai bloeiend aan achter de sluis, en even later in hogere ruigte begroeiing op de oever.

Terug gekomen bij de auto's hadden we een boeiende excursie beleefd met een redelijk aantal van rond de 220 taxa, gezien in een interessant gedeelte van district 7 met een fluviaal flora aspect.