

HYPERICUM 11, maart 2013

Excursieverslagen FWT-FLORON 2011

P.F. Stolwijk & O.G. Zijlstra

VOLTHE, EVERLO, 23 april 2011 (7 deelnemers)

Het bezochte km-hok (261-486) beslaat de Havezathe Het Everlo met het omringende (natte) bosgebied. De Havezathe is met de meeste grond in 2005 aan Natuurmonumenten overgedaan. Natuurmonumenten heeft een aantal gedeelten opengesteld die vroeger niet vrij toegankelijk waren.

We bleken op de juiste tijd dit goed ontwikkelde voorjaarsbos te bezoeken: alle te verwachten soorten hebben we wel aangetroffen. In totaal zijn er 237 taxa gestreept, waaronder echter een tiental ingebrachte dan wel verwilderde soorten zoals bijv. *Agrimonia eupatoria* (Gewone agrimonie), die in Twente wild nauwelijks aanwezig is, en *Origanum vulgare* (Wilde marjolein).

In het bos, de slootjes en de bermen zagen we o.a.: *Adoxa moschatellina* (Muskuskruid), *Blechnum spicant* (Dubbeloof), *Circaea lutetiana* (Groot heksenkruid), *Crataegus laevigata* (Tweestijlige meidoorn), *Epilobium montanum* (Bergbasterdwederik), *Hieracium vulgatum* (Dicht havikskruid), *Maianthemum bifolium* (Dalkruid), *Melampyrum pratense* (Hengel), *Oenanthe aquatica* (Watertorkruid), *Oxalis acetosella* (Witte klaverzuring), *Polygonatum multiflorum* (Gewone salomonszegel), *Rumex sanguineus* (Bloedzuring), *Scirpus sylvaticus* (Bosbies), *Stachys sylvatica* (Bosandoorn), *Stellaria holostea* (Grote muur), *Tilia platyphyllos* (Zomerlinde), *Viola reichenbachiana* (Donkersporig bosviooltje), *V. riviniana* (Bleeksporig bosviooltje) en hun bastaard *Viola x bavarica*, die mogelijk algemener is in Twente dan tot voor kort gedacht.



Circaea lutetiana (foto OTTO ZIJLSTRA)

In het zuidoosten van het km-hok ligt nog een nat stuk heide. Hier waren aanwezig: *Drosera intermedia* (Kleine zonnedauw), *D. rotundifolia* (Ronde zonnedauw), *Juncus squarrosus* (Trekkrus), *Myrica gale* (Wilde gagel), *Rhynchospora fusca* (Bruine snavelbies), *Trichophorum cespitosum* subsp. *germanicum* (Veenbies).

In beide biotopen samen vonden we de volgende zegges: *Carex acutiformis* (Moeraszegge), *C. elongata* (Elzenzegge), *C. hirta* (Ruige zegge), *C. nigra* (Zwarte zegge), *C. panicea* (Blauwe zegge), *C. pilulifera* (Pilzegge), *C. remota* (IJle zegge).

De koffie met appeltaart op het terras van de Havezathe smaakte ons daarna uitstekend.

VASSERHEIDE, 21 mei 2011 (5 deelnemers)

Km-hok 254-492 bleek met 161 taxa minder rijk dan we gehoopt hadden. De heide leverde de te verwachten soorten op: *Genista anglica* (Stekelbrem), *Juniperus communis* (Jeneverbes) en *Nardus stricta* (Borstelgras). In de houtwallen was zo waar *Adoxa moschatellina* (Muskuskruid) aan te treffen naast *Stellaria holostea* (Grote muur) en het uit het Onzoel komende beekje herbergde *Veronica beccabunga* (Beekpunge)



Genista anglica (foto OTTO ZIJLSTRA)

ENGBERTSDIJKSVENEN-WEST, 18 juni 2011 (4 deelnemers)

Vanaf de Paterswal, de weg die de westgrens vormt van dit uitgestrekte veengebied, trokken we de Engbertsdijksvenen (241-497) in. Lopend langs het toegangspad noteerden we onder meer *Lysimachia thysiflora* (Moeraswederik) en *Osmunda regalis* (Koningsvaren). Een overmoedige Andries van Renssen merkte al binnen een kwartier dat je op moet passen wanneer je in dit terrein van het pad afdwaalt; tussen *Molinia*-bulten en pollen *Eriophorum vaginatum* (Eenarig wollegras) kan men hier gemakkelijk tot aan de romp wegzakken... In dit hok zagen we nog twee grote plekken met **Myrica gale** (Wilde gagel). In totaal 145 taxa. Via het noordelijk deel van km-hok 241-496 liepen we langs de Dalweg terug richting Paterswal. Aan de Dalweg troffen we onder meer *Rhynchospora alba* (Witte snavelbies), *Juncus squarrosus* (Trekruis) en *Carex nigra* en *C. panicea* (Zwarte en Blauwe zegge) aan. Uiteindelijk werden in dit hok 122 taxa gestreept.

BEUNINGER BINNENVELD, 10 september 2011 (5 deelnemers)

Het km-hok 267-485 is voor een grootste deel niet (legaal) toegankelijk, omdat het deel uitmaakt van het landgoed Meuleman. We zijn aan de noordoever van het Omleidingkanaal (ook al niet toegankelijk) naar het noorden gelopen en via de brug in 267-486 aan de oostoever weer terug. Enigen van ons zijn de aangrenzende heide binnengegaan en hebben daar de betere vondsten gedaan.

Aan het Omleidingkanaal noteerden we de volgende soorten: *Berula erecta* (Kleine watereppe), *Dianthus deltoides* (Steenanjer), *Rhinanthus angustifolius* (Grote ratelaar), *Scirpus sylvaticus* (Bosbies), *Scutellaria galericulata* (Gewoon glidkruid). Verrassend was een struik *Rosa rubiginosa* (Egelantier). De heide leverde *Gentiana pneumonanthe* (Klokjesgentiaan), *Myrica gale* (Wilde gagel), *Rhynchospora fusca* (Bruine snavelbies), *Trichophorum cespitosum* subsp. *germanicum* (Veenbies).

Minder dan een kwart van het km-hok is bekeken; het leverde 158 taxa op.

Deelnemers aan de excursies

Johan Alferink, Jacques Bielen, Wytze Boersma, Rutger Bremer, Joop van Damme, Jan Meutstege, Harvey Pearson, Andries van Renssen, Jo Schunselaar, Henk Schurink, Pieter Stolwijk, Wolfgang Waanders, Otto Zijlstra
