

NIEUWSBRIEF FLORON-FWT, NR. 19, NOVEMBER 1998

Steenkruidkers (*Lepidium ruderales* L.) als bermhalofiet

F. Lippe

De waarneming van Steenkruidkers (*Lepidium ruderales*) als kolonist van auto-wegbermen (STOLWIJK, 1998: 8) bevestigt mijn indruk dat de soort nagenoeg dezelfde biotoopvoorkeur toont als Deens lepelblad (*Cochlearia danica*). In de 104 km-hokken van de gemeente Veghel (oostelijk Noord-Brabant, FLORON-district 19) vond ik Steenkruidkers in 5 km-hokken langs de wegen N265 en N266. Op een plek groeide de soort op een met baksteen beklede helling van de oprit van een brug zonder Deens lepelblad in de naaste omgeving. Alle vier de andere plaatsen leverden beide soorten bij elkaar op. Daar Deens lepelblad in 20 van de 104 km-hokken gevonden werd, is het duidelijk dat Steenkruidkers nog altijd een stuk minder algemeen is dan Deens lepelblad, al vertoont het eenzelfde verspreiding. Overigens is het merkwaardig dat Steenkruidkers op twee plaatsen samen met Handjesgras (*Cynodon dactylon*) langs de rand van het wegdek groeit. Ik vraag mij af of dat een toevalligheid is dan wel dat die combinatie vaker voorkomt.

Literatuur

STOLWIJK, P. F. (1998). Steenkruidkers (*Lepidium ruderales*) in Twente. [Nieuwsbrief FLORON - FWT 18.](#)
