

NIEUWSBRIEF FLORON-FWT, NR. 20, NOVEMBER 1999

Excursieverslagen FLORON-FWT 1998

P.F. Stolwijk, O.G. Zijlstra & J.W. Bielen

VASSE, 9 mei 1998; 10 deelnemers.

Het kleinschalige landschap ten noorden van Vasse was het eerste excursiedoel in 1998. We bezochten zes kilometerhokken; in totaal werden ruim 600 streepjes gezet. Km-hok 252-495 (Westerhoek) leverde onder meer het in Twente zeldzame Klein kaasjeskruid (*Malva neglecta*), Hoenderbeet (*Lamium amplexicaule*) en de hier vrij algemene Zwarte toorts (*Verbascum nigrum*) op. Deze soort vonden we ook in de bermen in 252-496 (Mader) en 253-495 (Vasse Noord). In laatstgenoemde km-hok verder onder meer Kleine bevernel (*Pimpinella saxifraga*), Hemelsleutel (*Sedum telephium*) en Liggend hertshooi (*Hypericum humifusum*). De leukste vondst in hok 253-496 (Molen Bels) was die van enkele planten Paarbladig goudveil (*Chrysosplenium oppositifolium*) langs de Mosbeek. In de smalle bosstrook met hier en daar Zomerlinde (*Tilia platyphyllos*) zagen we ook nog Muskuskruid (*Adoxa moschatellina*). Een bezoek aan een brongraslandje in 254-497 (Galgenberg) tenslotte bleek zeer de moeite waard. Als bijzondere soorten noteerden we hier nog Groot bronkruid (*Montia fontana* subsp. *fontana*), Brede orchis (*Dactylorhiza majalis* subsp. *majalis*), meer dan 150 planten; voorts nog Waterkruiskruid (*Senecio aquaticus*), Moerasviooltje (*Viola palustris*) en de bastaard van Scherpe en Zwarte zegge (*Carex x elytroides*).

ALBERGEN, 4 juli 1998; 13 deelnemers.

Ten zuiden van het Kanaal Almelo-Nordhorn werden 3 kilometer-hokken bezocht. In 246-486 (Vossenveldweg) werden de meeste soorten genoteerd: 165. De bermen leverden onder meer Hazenpootje (*Trifolium arvense*), Wilde bertram (*Achillea ptarmica*), Oranje havikskruid (*Hieracium aurantiacum*) en Kruipganzerik (*Potentilla anglica*) op. Langs het Kanaal Almelo-Nordhorn vonden we Grote ratelaar (*Rhinanthus angustifolius*) en aan het fietspad Langbaardgras (*Vulpia myuros*). Km-hok 245-487 (Pooksbelten), waar we al 209 soorten kenden, werd terloops bekeken. 84 soorten werden genoteerd, waarvan er 9 nieuw waren. Het laatste blok 245-486 (Brandrietsweg) bracht slechts 158 soorten. Het vermelden waard waren hier Kleine leeuwenklauw (*Aphanes inexpectata*), Snavelzegge (*Carex rostrata*), Dicht havikskruid (*Hieracium vulgatum*) en Wateraardbei (*Potentilla palustris*).

RIJSSEN, 5 september 1998; 10 deelnemers. Op deze herfstige dag werden twee km-hokken bezocht in de Hoch, een gebied met veel dennenbos op droge zandgrond, ten zuiden van de A1 bij Rijssen. In km-hok 232-477 vonden we 128 soorten, waaronder massaal Tandjesgras (*Danthonia decumbens*) en Jeneverbes (*Juniperus communis*); verder zagen we Bosaardbei (*Fragaria vesca*), Stekelbrem (*Genista anglica*), Bosdroogbloem (*Gnaphalium sylvaticum*). Op aanwijzing van Henri Ludwig konden we een groeiplaats van Grote wolfsklauw (*Lycopodium clavatum*) vinden. Aan de rand van de A1 stond behalve het onvermijdelijke

Deens lepelblad (*Cochlearia danica*) en Hertshoornweegbree (*Plantago coronopus*) ook Behaard breukkruid (*Herniaria hirsuta*), de tweede vondst in Twente; en in het talud van een viaduct Bergroos (*Rosa glauca*).

In km-hok 233-477 streepten we slechts 107 soorten. Zwarte toorts (*Verbascum nigrum*), Moerasbeemdgras (*Poa palustris*) en Liggend hertshooi (*Hypericum humifusum*) waren hier de aardigste soorten.
