

# NIEUWSBRIEF FLORON-FWT, NR. 22, NOVEMBER 2001


## Excursieverslagen FLORON - FWT 1999

P.F. Stolwijk & J.W. Bielen

FLERINGEN, 8 mei; 9 deelnemers.

We zijn deze ochtend in twee groepen op pad gegaan.

De groep onder leiding van Otto bezocht km-hok 254-492 (Lädderken). Het Haarlergrafveld bleek goed voor Kruipbrem (*Genista pilosa*) en Stekelbrem (*G. anglica*); beide soorten staan op de nieuwe Rode Lijst 2000, en vooral Kruipbrem is in Twente sterk achteruitgegaan.



Verdere leuke vondsten waren Appelbes (*Aronia x prunifolia*) en Valse kamille (*Anthemis arvensis*). Deze laatste soort is in het noorden van Twente op verschillende plaatsen te vinden.

Het totale aantal standaardlijstsoorten bedraagt nu 157.

In km-hok 255-492 (Onzoel) bezocht men een moerassig terreintje met soorten als Bittere veldkers (*Cardamine amara*), Scherpe zegge (*Carex acuta*), Tweerijige zegge (*Carex disticha*), Donkergroene basterdwederik (*Epilobium obscurum*), Holpijp (*Equisetum fluviatile*), Grote ratelaar (*Rhinanthus angustifolius*), Bosbies (*Scirpus sylvaticus*), Watermuur (*Stellaria aquatica*) en Beekpunge (*Veronica beccabunga*). Ook Hondsviooltje (*Viola canina*) werd in dit km-hok aangetroffen. Het totaal komt op 184.

Pieter bezocht met zijn groep een 'leeg' km-hok (Borggreve, 255-491) en vond daar een aantal bossoorten zoals Gele dovenetel (*Lamium galeobdolon*), Valse salie (*Teucrium scorodonia*) en Bleeksporig bosviooltje (*Viola riviniana*). Het aantal soorten kwam op 175.

WIERDEN, 12 juni; 9 deelnemers.

We hebben in een groep km-hok 234-486 (Meijerinksberg) geïnventariseerd. Aan de Nottermorsweg vonden we Valse akkerkers (*Rorippa x armoracioides*) en Bieslook (*Allium schoenoprasum*); van deze laatste soort krijgen we de indruk dat ze zich de laatste jaren uitbreidt, vooral aan grote wegen. Aan de spoorbaan stonden Heksenmelk (*Euphorbia esula*) en Hondsviooltje. Langs een akker zagen we Zwenkdravik (*Anisantha tectorum*), Grijskruid (*Berteroa incana*), Gewoon langbaardgras (*Vulpia myuros*) en Korenbloem (*Centaurea cyanus*), de laatste tegenwoordig een Rode Lijst-soort! Aan de provinciale weg stond, behalve de inmiddels gebruikelijke soorten als Deens lepelblad (*Cochlearia danica*), Herts-hoornweegbree (*Plantago coronopus*) en Steenkruidkers (*Lepidium ruderales*), ook nog Bolletjesraket (*Rapistrum rugosum*). Het aantal soorten kwam op 193.

DEDEMSVAART, 10 juli; 12 deelnemers.

De bedoeling van deze excursie was om waterplanten op te sporen. Vanwege de goede opkomst zijn we weer in twee groepen op weg gegaan.

Otto kamde km-hok 226-509 (Arriërveld) uit en vond o.a.: Kalmoes (*Acorus calamus*), Zwanenbloem (*Butomus umbellatus*), Grof hoornblad (*Ceratophyllum demersum*), Kikkerbeet (*Hydrocharis morsus-ranae*), Moeraswederik (*Lysimachia thyrsiflora*), Schedefonteinkruid (*Potamogeton pectinatus*), Pijlkruid (*Sagittaria sagittifolia*), Veelwortelig kroos (*Spirodela polyhriza*), Gewoon / Vergeten blaasjeskruid (*Utricularia vulgaris / australis*).

Pieter struinde door km-hok 228-511 (Breeslag) en noteerde o.a.: Waterviolier (*Hottonia palustris*), Schedefonteinkruid, Pijlkruid, Veelwortelig Kroos en Krabbescheer (*Stratiotes aloides*).

Na de lunchpauze hebben we twee km-hokken aan de zuidoever van de Vecht gedeeltelijk bekeken. In km-hok 228-504 (Arriëresweg) stonden Kalmoes, Zwanenbloem, Geel walstro (*Galium verum*), Klein timoteegras (*Phleum pratensis* subsp. *serotinum*), Pijlkruid, Kleine egelskop (*Sparganium emersum*) en Lange ereprijs (*Veronica longifolia*). In 229-504 (Junne) Gevleugeld sterrenkroos (*Callitriche stagnalis*), Klein timoteegras, Pijlkruid, Echte guldenroede (*Solidago virgaurea*) en Lange ereprijs.

RIJSSEN, 11 september; 5 deelnemers.

Met ons vijven hebben we een landbouwhok met wat sloten (Zandhaar, 230-478) en een droog heideterrein (Brekelveld, 231-478) geïnventariseerd. Het landbouwhok leverde de volgende soorten op: Knikkend tandzaad (*Bidens cernua*), in dit deel van Twente zeldzaam, Kleine margriet (*Leucanthemum paludosum*), achtste vondst in Twente, en Blonde egelskop (*Sparganium erectum* subsp. *neglectum*). Totaal 161 soorten.

Het droge terrein was goed voor: Zandstruisgras (*Agrostis vinealis*), Tandjesgras (*Danthonia decumbens*), Kraaihei (*Empetrum nigrum*), Bosaardbei (*Fragaria vesca*), Borstelgras (*Nardus stricta*) en Echte guldenroede.

Totaal 133 soorten.

Aan de excursies hebben deelgenomen:

Elly Arends, Jacques Bielen, Wytze Boersma, Jan Engelen, Jaap Groot, Wim Haenen, Marcel Hospers, Hr. en Mevr. Jonkers, Johan Kers, Henri Ludwig, Gerrit Meutstege, Jan Meutstege, Henk Ruiters, Peter Spee, Pieter Stolwijk, Piet Vogelzang, Serge Vogelzang, Otto Zijlstra.

---